



Полное отторжение

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM (1)



ОТТОРЖЕНИЕ ИМПЛАНТАТОВ
**ВОЗМОЖНО КАК В ПЕРВЫЕ
ДНИ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ,**

ТАК И В ПЕРИОД
ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ,
А В ОСОБЫХ
СЛУЧАЯХ И СПУСТЯ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.

РИСК ОТТОР-
ЖЕНИЯ ЗУБНЫХ
ИМПЛАНТАТОВ —
ВСЕГО 2 %



ПОЧЕМУ ИМПЛАНТАЦИЯ СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ?

Секрет успеха установки зубных имплантатов кроется в свойствах титана, из которого они сделаны. По одной из версий, материал назвали в честь королевы фей Титании — героини пьесы Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», а получил он такое название благодаря своей легкости. Но самое ценное в титане — это то, что он не воспринимается человеческим организмом как инородный элемент, а следовательно, и не отторгается. Однако в некоторых случаях отторжение зубного имплантата все же возможно.



Дахильгов Магомед Уматгиреевич
челюстно-лицевой хирург

Опыт работы: более 20 лет

НЕМЕЦКИЙ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«Отторжения в большинстве случаев возникают до того, как имплантат полностью приживется. Причины у осложнения множество, но чаще всего — это банальное несоблюдение рекомендаций врача и жевание твердой пищи. Не стоит также забывать и про другие осложнения. Так, неправильно установленный имплантат приводит к оголению десневого края. В этом случае часть искусственного корня будет видна из-под десны. Такая серьезная ошибка влечет за собой многочисленные проблемы и даже может вызвать отторжение. К таким же осложнениям может привести установка слишком крупного имплантата. Конечно же, особое значение данная проблема имеет при имплантации передних зубов, где эстетика всегда стоит на первом месте.»

У разных докторов и производителей имплантатов есть свой показатель приживаемости. Опыт (более 15 лет), правильное планирование и применение лучших имплантатов сводит показатель отторжения в нашем Центре менее чем к 1 %. Если вы заметили неприятные ощущения и гнойные выделения в области установленного имплантата — следует немедленно обратиться к доктору. Самым оптимальным лечением в подобном случае будет удаление старого и установка нового имплантата».

СИМПТОМЫ ОТТОРЖЕНИЯ В ПЕРВЫЕ ДНИ

Признаками отторжения зубного имплантата в первые дни после дентальной имплантации являются сильное кровотечение, которое невозможно остановить, отек и воспаление десны вокруг искусственного корня, а также острая боль, которую невозможно снять обезболивающими. Небольшая кровоточивость, легкая припухлость, а также ноющая боль в течение первых 2 — 3 дней являются нормой. Если все эти симптомы длятся дольше или проявляются слишком остро — это первый признак того, что организм не принимает имплантат или же началось воспаление. В подобном случае необходимо немедленно обратиться к врачу-имплантологу. Стоит также отметить, что отторжение имплантата может произойти и без каких-либо явных симптомов.

ПРИЗНАКИ ОТТОРЖЕНИЯ В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД

Образование припухлостей, кровотечение, болезненные ощущения в области установленного имплантата — тревожные симптомы наличия инфекции. Если вовремя не обратиться к врачу-имплантологу, то воспалительный процесс перейдет на кость челюсти, что сделает имплантат подвижным и, в конечном счете, спровоцирует его потерю.

ПРОЦЕНТ ПРИЖИВАЕМОСТИ — КАК НЕ ПОПАСТЬ В ЗОНУ РИСКА

Общеизвестный процент приживаемости современных зубных имплантатов составляет в среднем 95 — 98 %. Тем не менее, любой добросовестный врач-имплантолог обязан предупредить о возможности отторжения зубного имплантата, пусть и маловероятной. Специалист также должен провести необходимое обследование и внимательно изучить медицинскую карту пациента, дабы исключить наличие противопоказаний к имплантации, игнорирование которых чаще всего и приводит к подобному осложнению.



ПОЧЕМУ ЗУБНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ ОТТОРГАЮТСЯ?

- Системные заболевания.** Такие заболевания иммунной системы, как СПИД и ВИЧ, ведут не только к риску во время проведения имплантации, но и почти в 100 % влекут за собой отторжение имплантата. Усложняет операцию и провоцирует осложнения инсулинзависимый сахарный диабет. Гипертоническая болезнь, равно как и раковые заболевания, как в стадии обострения, так и в стадии ремиссии также чреваты риском отторжения зубного имплантата.
- Несоблюдение рекомендаций врача.** Чрезмерная нагрузка на свежеставленный имплантат, несоблюдение правил гигиены полости рта, отказ от профилактических посещений и послеоперационного наблюдения, курение — все это может привести к потере имплантата.
- Аллергия на зубные имплантаты.** Также причиной отторжения имплантатов может быть редкая форма непереносимости титана, из которого делают искусственные корни.
- Имплантаты низкого качества.** Также одной из причин отторжения могут быть сами зубные имплантаты — поддельный, изготовленный из некачественного титана или же произведенный с нарушениями технологии производства. Поэтому выбирайте проверенные имплантологические системы.
- Врачебные ошибки.** К распространенным врачебным ошибкам, приводящим к отторжению, относят: неправильную оценку противопоказаний, отказ от костной пластики и синус-лифтинга при условии нехватки объема кости; недостаточную стерильность инструментов или помещения; повреждение имплантата или костной ткани во время установки.

ПРИ ОТСУТСТВИИ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
РИСК ОТТОРЖЕНИЯ
ОБУСЛОВЛЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ОСОБЕННО-
СТЯМИ ИММУННОЙ
СИСТЕМЫ.